

TRASTORNOS EN LA RECEPCIÓN DEL MISATGE

SISTEMAS AUGMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE
LA COMUNICACIÓN

JULIA TIBAU, ROCIO MEJIA, HELENA MARTINEZ, ALBA PUIG IRA

CONTINGUT

1. TRANSTORN EN LA RECEPCIÓ DEL
MISSATGE

2. DEFICIÈNCIA SENSORIAL AUDITIVA O
HIPOACÚSIA

3. DEFICIÈNCIA SENSORIAL VISUAL

4. SORDCEGUESA



TRASTORNOS DE RECEPCIÓ DEL MISSATGE

És aquell que afecta una funció sensorial que permet captar-lo.
Rep la majoria d'estímuls de l'exterior mitjançant l'oïda i la vista, i
les alteracions de l'audició i la visió afecten també la capacitat del llenguatge
en general

DEFICIÈNCIA SENSORIAL AUDITIVA O HIPOACÚSIA

És la limitació important o absoluta en la percepció correcta dels sons

Afecte tots els aspectes de la vida, depèn de:

- Afectació



Hipoacusia unilateral



Hipoacusia bilateral



- Grau de pèrdua auditiva
 - **Hipoacúsia lleu o lleugera:** (pèrdua inferior a 40dB), es perden alguns sons i costa d'entendre el que se sent. Però, es pot captar la veu i fer vida quotidiana.
 - **Hipoacúsia mitjana o moderada:** (pèrdua entre 40 i 70 dB), només es perceben sons molt alts i sense una pròtesi auditiva costa d'entendre. S'utilitza la lectura labial i audiòfons.
 - **Hipoacúsia severa o sordesa:** (pèrdua entre 70 i 90dB) No se sent ni la veu ni alguns sons. La mateixa persona no se sent la seva veu i no pot adquirir el llenguatge de manera espontània. Es fa servir la lectura labial i el suport logopèdic.
 - **Hipoacúsia profunda o sordesa profunda:** (pèrdua superior a 90 dB) No es perceben sons i l'audició deixa de ser funcional per la vida. El llenguatge es percep per via visual, sol estar acompanyada de mudesa.
 - **Cofosi o anacúsia:** La pèrdua d'audició és total.



LOCALITZACIÓ DE LA LESIÓ

Hipoacúsia conductiva o de transmissió:

La lesió per malaltia o obstrucció i se situa a l'orella externa o mitjana. Això fa que afecti totes les freqüències de so

Hipoacúsia perceptiva o neurosensorial

La lesió està en l'orella interna o al nervi auditiu. Algunes freqüències estan més afectades per la qual s'hi sent de manera molt distorsionada

Hipoacúsia central

La lesió se situa a les àrees cerebrals relacionades amb l'audició



M O M E N T D E L ' A P A R I C I Ó

Hipoacúsia prelocutiva

Apareix abans d'haver adquirit i desenvolupar el llenguatge i, en conseqüència, el pensament abstracte aprox. abans dels 3 anys.

Hipoacúsia perilocutiva

Es presenta durant el període de desenvolupament de la parla, entre els 2 i els 4 anys

Hipoacúsia perlocutiva

El llenguatge ja s'ha adquirit i s'ha començat a desenvolupar el pensament abstracte a partir dels 4 anys

DEFICIÈNCIA SENSORIAL VISUAL

Limitació severa o absència de visió.

- Debilitat visual:** Resta visual superior al 30%. És possible l'escolització de l'infant, tot i que pot caldre adaptar materials.
- Hipovisió profunda:** Resta visual entre el 20 i el 30%. Es perceben nítidament els colors i els volums es veuen més ben definits. La visió d'aprop permet l'escolarització amb suports per la lecto-escriptua.
- Ceguesa parcial:** Resta visual entre 10 i el 20%. Es perceben la llum, la forma dels objectes i les masses, encara que de manera poc definida. Això permet la deambulació autònoma.
- Ceguesa total:** Resta visual inferior al 10%. Fins i tot si es pot percebre una mica de llum, no és possible obtenir informació de l'entorn.

Per conèixer el món, s'ha de recórrer a altres canals sensorials, principalment l'oïda i el tacte, per la qual cosa el desenvolupament cognitiu segueix un camí diferent.

SORDCEGUESA

És una discapacitat caracteritzada per l'existència simultània d'una deficiència auditiva i una deficiència visual.

Segons moment d'aparició

SORDCEGUESA CONGÈNITA O PRELOCUTIVA

- Infant no ha adquirit el llenguatge abans de la discapacitat
- Té un món molt limitat i li costa construir significats
- Intervenció més complexa

SORDCEGUESA ADQUIRIDA O POSTLOCUTIVA

- Apareix després d'haver après el llenguatge
- Es conserven coneixements prèvis i experiències
- Cal readaptar-se i desenvolupar nous recursos comunicatius

Segons afectació visual i auditiva

PERSONES PRINCIPALMENT SORDES

- Sovint congènites, després perden la visió

PERSONES PRINCIPALMENT CEGUES

- Sovint de naixement, després perden l'audició

PERSONES QUE PERDEN AUDICIÓ I VISIÓ ALHORA

SORDCEGUESA

És una discapacitat caracteritzada per l'existència simultània d'una deficiència auditiva i una deficiència visual.

ALTRES ASPECTES

- Pot aparèixer amb altres discapacitats (físiques, intel·lectual, etc) que dificulten l'aprenentatge i la comunicació.
- La intervenció es basa en l'ús intensiu dels sentits restants i en la comunicació tàctil.
- Quan les restes sensorials són molt limitades, el tacte és el principal mitjà de comunicació i aprenentatge



APSOCECAT

Associació Catalana
pro Persones
amb Sordceguesa

MOLTES GRÀCIES

TREBALL GRUPAL | TRAÏNS

JULIA TIBAU, ROCIO MEJIA, HELENA MARTINEZ, ALBA PUIG